

# Homens foram os mais acometidos por Aids no Amazonas de 2000 a 2010, diz estudo

Um estudo realizado na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado ([FMT-HVD](#)) indicou que os **homens** foram os mais acometidos por Aids e tuberculose no período de 2000 a 2010. O resultado foi obtido ao final do projeto de pesquisa intitulado 'Análise histórica dos casos de dengue, Aids e tuberculose registrados na Fundação. O estudo foi realizado no período de 2011 a 2012 pelo acadêmico do curso de Medicina da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Marcos da Conceição de Castro.

Ele informou que o objetivo foi analisar os aspectos epidemiológicos e clínicos de **Aids** e tuberculose entre os anos de 2000 a 2010, e de dengue no período de 1998 a 2010, registrados no Serviço de Vigilância Epidemiológica da FMT-HVD. "Os registros denotam que, com exceção da dengue, para os demais agravos houve um aumento das notificações com maior número de acometimentos na população masculina", disse Castro.

Diante dos resultados encontrados, o pesquisador alertou para a necessidade de intensificar as **estratégias** de prevenção e controle da Aids e da tuberculose, especialmente para homens. A pesquisa contou com financiamento do Governo do Estado, via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas ([Fapeam](#)), por meio do Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic).

## NÚMERO DE CASOS

Castro informou que após analisar os registros de atendimentos da FMT-HVD e dos casos de bancos de dados secundários, como os da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), foi realizada uma estratificação da frequência de casos por mês e ano, além de gênero, faixa etária, municípios e evolução da doença. "Foram achados 55.705 casos de dengue de 1998 a 2000, 2.908 diagnósticos de tuberculose e 4.324 registros de Aids de 2000 a 2010", disse o pesquisador.

Dos 55.705 casos de dengue, 40.786 foram no primeiro semestre do biênio 1998/1999. "A partir de então, houve um controle maior e estratégias preventivas bem traçadas", salientou. Dos 2.908 diagnósticos de tuberculose, 1.784 eram de tuberculose pulmonar; 843 extrapulmonar e 281 pulmonar e extrapulmonar com 1.958 registros em homens da faixa etária entre 20 e 34 anos. No mesmo período - 2000 a 2010 - foram registrados 4.324 diagnósticos de Aids com 1.945 óbitos. Do total de diagnosticados, 3.851 são homens na faixa etária de 20 a 49 anos.

**Fonte: Fapeam**